



**TABLEAU DES PRINCIPAUX TOPIQUES OPHTHALMOLOGIQUES PAR FAMILLE\***

Famille	DCI	Spécialités	Collyre/Pommade/ Gel	Indications	Contre-indications
<b>Antibiotiques</b>	Néomycine, polymyxine B	Atébémyxine, Cébémixine	C + P	Infections bactériennes de surface à germe sensible	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Norfloxacine	Chibroxine	C	Infections oculaires sévères à germe sensible	Hypersensibilité à l'un des constituants ; allaitement
	Ciprofloxacine	Ciloxan	C + P	Abcès cornéens, ulcères cornéens, conjonctivites et blépharites à germes sensibles	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Ofloxacine	Exocine	C	Infections oculaires sévères à germe sensible	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Acide fusidique	Fucithalmic	G	Infections externes de l'œil et de ses annexes dues aux germes sensibles	Allergie à l'acide fusidique
	Gentamicine	Gentalline	C	Conjonctivites, kératites et ulcères cornéens à germes sensibles	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Oxytétracycline	Posicycline	C + P	Infections bactériennes superficielles de l'œil (conjonctivites, kératites), ou de ses annexes (blépharites, dacryocystites), dues à des germes sensibles. Trachome	Hypersensibilité à l'un des constituants ; rétinoïdes ; grossesse, allaitement
	Rifamycine	Rifamycine	C + P	<i>Collyre et pommade</i> : conjonctivites, kératites et ulcères cornéens à germes sensibles. <i>Pommade</i> : blépharites et orgelet à germes sensibles	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Tobramycine	Tobrex	C + P	Infections des structures externes de l'œil et de ses annexes à germes sensibles	Hypersensibilité à l'un des constituants
<b>Antibiotiques + corticoïdes</b>	Bacitracine, colistine, hydrocortisone	Bacicoline	C	Suites de chirurgie ophtalmologique ; infections dues à des germes sensibles avec composante inflammatoire	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce. Médicaments non antiarythmiques donnant des torsades de pointes ; femme enceinte
	Dexaméthasone, néomycine	Chibro-Cadron, Dexagrane	C	Suites de chirurgie ophtalmologique ; infections dues à des germes sensibles avec composante inflammatoire	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique. Infections mycosiques ou tuberculeuses de l'œil. Antécédents personnels ou familiaux de glaucome. Kératoconjonctivites virales au stade précoce. Infections purulentes des paupières et de l'œil secondaires à des germes résistant à la néomycine
	Dexaméthasone, framycétine	Frakidex	C + P	Suites de chirurgie ophtalmologique ; infections dues à des germes sensibles avec composante inflammatoire	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce. Femme enceinte ou qui allaite. Médicaments non antiarythmiques donnant des torsades de pointes

Famille	DCI	Spécialités	Collyre/Pommade/ Gel	Indications	Contre-indications
<b>Antibiotiques + corticoïdes</b>	Dexaméthasone, néomycine, polymyxine B	Maxidrol	C + P	Uvéite, sclérite, épisclérite, conjonctivite allergique, kératite interstitielle. Inflammations et infections à germes sensibles des annexes (conjonctivite, tarsite, blépharite, orgelet, chalazion).	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce
	Dexaméthasone, tobramycine	Tobradex	C	Traitement anti-inflammatoire et antibactérien vis-à-vis des germes sensibles, après chirurgie de la cataracte.	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce. Femme enceinte ou qui allaite. Médicaments non antiarythmiques donnant des torsades de pointes. Autres aminosides, polymyxines par voie parentérale, toxine botulique
	Triamcinolone, néomycine	Cidermex	P	Suites de chirurgie ophtalmologique ; infections dues à des germes sensibles avec composante inflammatoire	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, antécédents glaucomateux personnels ou familiaux, atteinte oculaire tuberculeuse, kératoconjonctivites virales au stade précoce
	Dexaméthasone, oxytétracycline	Sterdex	P	Suites de chirurgie ophtalmologique ; infections dues à des germes sensibles avec composante inflammatoire	Hypersensibilité à l'un des constituants. Kératite herpétique épithéliale dendritique, kératite mycosique, kératoconjonctivite virale épidémique au stade précoce. Rétinoïdes. Femme enceinte à partir du deuxième trimestre. Allaitement. Médicaments non antiarythmiques, donnant des torsades de pointes
<b>Antibiotique + anti-inflammatoire non stéroïdien</b>	Indométacine, gentamicine	Indobiotic	C	Traitement anti-inflammatoire et antibactérien vis-à-vis des germes sensibles, après chirurgie de la cataracte	Antécédents d'hypersensibilité à l'un des composants. À partir du sixième mois de grossesse. Allergie avérée à l'indométacine et autres AINS. Antécédent de crise d'asthme liée à la prise d'aspirine ou à d'autres AINS.
<b>Antiseptiques</b>	Acide salicylique	Antalyre Sophtal	C	Irritations conjonctivales chroniques non infectieuses	Antécédent d'allergie à l'un des constituants
	Céthexonium	Bactyl Biocidan	C	Affections superficielles de l'œil et de ses annexes	Antécédent d'allergie au céthexonium ou autres ammoniums quaternaires
	Benzododécinium	Benzododécinium	C	Appoint antiseptique des affections superficielles de l'œil et de ses annexes	Hypersensibilité aux antiseptiques locaux de la famille des ammoniums quaternaires
	Hexamidine	Désomédine	C	Infections bactériennes de l'œil et de ses annexes à germes sensibles	Sensibilisation aux diamidines ou à l'un des constituants



**TABLEAU DES PRINCIPAUX TOPIQUES OPHTHALMOLOGIQUES PAR FAMILLE (SUITE)**

Famille	DCI	Spécialités	Collyre/Pommade/ Gel	Indications	Contre-indications
<b>Antiseptiques</b>	Vigne rouge	Ophthalmine	C	Irritation conjonctivale non infectieuse	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Synéphrine, berbérine, benzododécinium	Sédacollyre	C	Hyperhémies conjonctivales	Hypersensibilité aux ammoniums quaternaires ou à l'un des autres composants. Glaucome à angle étroit. Nourrisson de moins de 30 mois
	Picloxydine	Vitabact	C	Infections superficielles de l'œil et de ses annexes	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Thiomersal	Vitaseptol	C	Appoint dans les infections superficielles de l'œil et de ses annexes	Allergie au mercuriothiolate ou à un dérivé du mercure
<b>Antiviraux</b>	Ganciclovir	Virgan	G	Kératites aiguës superficielles dues au virus <i>Herpes simplex</i>	Hypersensibilité au ganciclovir, à l'aciclovir ou à l'un des excipients
	Trifluridine	Viroпта	C	Atteintes oculaires herpétiques du segment antérieur et de la conjonctive. Traitement, en association ou non avec les corticoïdes locaux, des kératites disciformes et kérato-uvéïtes	Hypersensibilité à la trifluridine
	Aciclovir	Zovirax	P	Kératite herpétique	Antécédent d'hypersensibilité à l'aciclovir et à ses dérivés
<b>Solutés de lavage oculaire</b>	Borate de sodium, acide borique	Dacrosérum Dacudoses	S	Lavage oculaire en cas d'irritation conjonctivale	Hypersensibilité à l'un des constituants
	Chlorobutanol, acide salicylique, alcool, acide borique	Optrex	S	Lavage oculaire en cas d'irritation conjonctivale	Hypersensibilité à l'acide salicylique, aux substances d'activité proche ou aux autres constituants
	Acide salicylique	Phylarm	S	Lavage oculaire en cas d'irritation conjonctivale	Hypersensibilité à l'acide salicylique, aux substances d'activité proche ou aux autres constituants
<b>Anti-inflammatoires non stéroïdiens</b>	Kétorolac trométhamine	Acular	C	Prévention et traitement de l'inflammation oculaire dans les suites immédiates de la chirurgie de la cataracte	Hypersensibilité à l'un des constituants. Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de kétorolac trométhamine ou de substances d'activité proche telles que l'aspirine ou d'autres AINS. Femme enceinte (à partir du sixième mois)
	Indométacine	Indocollyre	C	Inhibition du myosis peropératoire. Prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur. Traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des premiers jours postopératoires	Allergie avérée ou antécédent de crise d'asthme liée à l'indométacine, aux substances d'activité proche telles que les autres AINS et l'aspirine. Ulcère gastro-duodéal en évolution. Insuffisance hépatocellulaire sévère. Insuffisance rénale sévère

Famille	DCI	Spécialités	Collyre/Pommade/ Gel	Indications	Contre-indications
<b>Anti-inflammatoires non stéroïdiens</b>					Femme enceinte (à partir du sixième mois). Autres AINS <b>à fortes doses, anticoagulants</b> oraux, héparine, lithium, méthotrexate à fortes doses.
	Flurbiprofène	Ocufen	C	Inflammation du segment antérieur de l'œil après chirurgie de la cataracte et trabéculoplastie au laser Argon. Prévention de l'œdème maculaire cystoïde de l'aphaque survenant après extraction chirurgicale du cristallin. Inhibition du myosis peropératoire.	Hypersensibilité à l'un des constituants Antécédents d'allergie ou d'asthme déclenchés par la prise de flurbiprofène ou de substances d'activité proche telles que l'aspirine ou d'autres AINS. Femme enceinte au-delà de vingt-quatre semaines d'aménorrhée (cinq mois de grossesse révolus)
	Diclofénac	Voltarène	C	Inhibition du myosis au cours de la chirurgie de la cataracte. Prévention des manifestations inflammatoires liées aux interventions chirurgicales de la cataracte et du segment antérieur Traitement des manifestations douloureuses oculaires liées à la kératectomie photoréfractive au cours des vingt-quatre premières heures postopératoires	Antécédents d'allergie à l'un des constituants, ou d'asthme déclenché par la prise de diclofénac ou de substances d'activité proche telles que l'aspirine ou d'autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS). À partir du sixième mois de la grossesse.
<b>Anti-inflammatoires stéroïdiens (corticoïdes)</b>	Dexaméthasone	Dexaméthasone Maxidex	C	Uvéites, sclérites, épisclérites, conjonctivites allergiques, kératites interstitielles	Hypersensibilité aux sulfites, aux parabènes ou à l'un des autres composants. Infection bactérienne ophthalmique. Kératite herpétique, épithéliale, dendritique. Kératoconjonctivite mycosique. Kératoconjonctivite virale. Tuberculose oculaire
	Fluorométholone	Flucon	C	Affections allergiques conjonctivo-palpébrales. Kératites. Uvéites antérieures. Réactions inflammatoires postopératoires. État inflammatoire du globe oculaire associé à un glaucome en raison de la faible action glaucomatogène de la fluorométholone.	Kératite herpétique ou mycosique, atteinte oculaire tuberculeuse
	Rimexolone	Vexol	C	Inflammation postopératoire en chirurgie de la cataracte. Uvéite antérieure. Conjonctivite allergique	Hypersensibilité à l'un des composants. Kératite herpétique, épithéliale, dendritique, kératoconjonctivite virale en phase aiguë, kératoconjonctivites mycosique, bactérienne, et à mycobactéries



**TABLEAU DES PRINCIPAUX TOPIQUES OPHTALMOLOGIQUES PAR FAMILLE (SUITE)**

Famille	DCI	Spécialités	Collyre/Pommade/ Gel	Indications	Contre-indications
<b>Suppléance lacrymale</b>	Hypromellose	Artelac	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament
	Carmellose	Celluvisc	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec dans ses manifestations modérées	
	Carbomère 934 P	Siccafluid	G	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament
	Carbomère 974 P	Gel-larmes, Lacryvisc	G	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament. Liées au chlorure de benzalkonium (tube) : antécédents allergiques au chlorure de benzalkonium. Porteurs de lentilles souples
	Carbomère 980	Lacrifluid, Liposic	G	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament
	Carbomère 980 NF	Civigel, Lacrigel, Lacrinorm	G	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament. Antécédents d'allergie au cétrimide (Lacrigel)
	Povidone	Dulcilarmes, Fluidabak, Nutrivisc, Unifluid	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament
	Alcool polyvinylique, povidone	Refresh	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec dans ses manifestations modérées	
	Sodium chlorure	Larmabak, larmes artificielles, Unilarm	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec dans ses manifestations modérées	
	Sodium chondroïtine sulfate	Lacrypos	C	Traitement symptomatique du syndrome de l'œil sec	Hypersensibilité à l'un des composants du médicament
	Hydroxypropylcellulose	Lacrisert	Insert	Traitement symptomatique des formes sévères du syndrome de l'œil sec, en particulier lorsqu'un traitement adéquat par les larmes artificielles s'est avéré insuffisant	Antécédents d'allergie à l'hydroxypropylcellulose (ou sensibilisation de groupe)

\* Liste non exhaustive de médicaments.  
Consulter le tableau dans son intégralité sur [egora.fr](http://egora.fr), en particulier la liste des antiglaucomateux.

suite de la p. 597

balance avec le risque collectif de sélectionner des souches résistantes. Aussi, en l'absence de critère de gravité ou de facteur de risque, le recours à un antibiotique (rifamycine, cyclines, aminosides et quinolones sont les principaux antibiotiques disponibles en topiques ophtalmologiques) ne doit pas être systématique. Le traitement des conjonctivites bactériennes comporte avant tout un lavage oculaire associé à un antiseptique, le traitement antibiotique étant réservé aux formes graves. De même, dans les blépharites, l'efficacité de l'antibiothérapie locale n'est pas supérieure à celle des anti-inflammatoires locaux ou des soins de paupières. Elle n'est utile qu'en cas de surinfection associée.

En revanche, les kératites bactériennes peuvent être traitées par antibiothérapie locale, après prélèvement préalable, dès qu'il existe un facteur de gravité. Dans certaines formes de kératites profondes (comme les abcès cornéens, fréquemment associés au port de lentilles) et dans les infections endoculaires (endophtalmies), on peut avoir en plus recours à des collyres dits « renforcés » (mélanges d'antibiotiques ou d'antifongiques à présentation parentérale à une solution instillable dans l'œil – habituellement un collyre antiseptique –, préparés par les pharmacies hospitalières).

Dans le cas particulier du chalazion (inflammation secondaire à l'occlusion d'une glande intrapalpébrale de